

Apéndice B. Instrumento

 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS			Facultad de odontología – especialización en endodoncia		
Implementación del material para el manejo inmediato de trauma dentoalveolar en miembros que integran ligas de deporte de alto impacto					
Objetivo: Determinar el conocimiento de los entrenadores y deportistas de deporte de alto impacto en la ciudad de Bucaramanga antes y después de la implementación de un material educativo sobre el manejo inmediato del trauma dentoalveolar.					
Nombre:			Edad:		
Fecha:					
Genero:		Liga al que pertenece:		Nivel educativo:	
F ☐ M ☐		Baloncesto ☐ Futbol ☐ Rugby ☐		Bachiller ☐ Pregrado ☐ Posgrado ☐ Maestría ☐ Especialización ☐ Doctorado ☐	
Cargo			Años de experiencia		
Entrenador ☐ Jugador ☐			e0-2 ☐ 2-4 ☐ 4-5 ☐ +5 ☐		

A continuación, se presentarán una serie de preguntas a las cuales usted debe contestar con una X lo que crea correcto, basándose en lo que usted realizaría en caso de presentar una eventualidad de trauma dentoalveolar (TDA)

1. ¿Para usted qué es el trauma dentoalveolar (TDA)?

- a. Un tipo de cefalea. ☐
- b. impacto agresivo sobre las estructuras biológicas dentales y/o estructuras adyacentes del hueso de las cuales se deriva algún tipo de lesión. ☐
- c. Un tipo de problemas en las encías. ☐

2. ¿Qué manejo daría usted a un deportista, si al momento de realizar la práctica deportiva se presenta un trauma dentoalveolar? a. Tranquilizar al deportista lesionado ☐ b. Realizar los primeros auxilios ☐ c. Remitir al Servicio de Urgencias ☐ d. Remitir al odontólogo especialista ☐	
3. ¿Considera usted que es importante tener conocimiento al momento de presentarse un trauma dentoalveolar? a. Si ☐ b. No ☐	
4. ¿si su respuesta fue sí, que tan importante considera tener conocimiento al momento de presentarse un trauma dentoalveolar? a. Ninguno ☐ b. Poco ☐ c. Mucho ☐	
5. De las siguientes opciones, ¿Cuál tipo de trauma dentoalveolar conoce usted? (Marque todas las que correspondan) a. Subluxación ☐ b. Luxación ☐ c. Fractura ☐ d. Avulsión ☐ e. Intrusión ☐ f. Ninguna ☐	
6. En caso de un trauma dentoalveolar durante un entrenamiento y/o partido ¿Sabe usted a dónde debe dirigirse como primera opción para la atención de urgencia? a. Odontólogo ☐ b. Medico ☐ c. Enfermería ☐ d. Ninguna ☐	
7. Al presentarse una laceración en los tejidos blandos (labio y/o encía), ¿Cuál de las siguientes opciones sería lo más indicada? a. Realizar lavado y tratar de controlar el sangrado (Hemostasia) ☐ b. Poner hielo sobre la zona lesionada del deportista ☐ c. Sacar al jugador del juego y que se dirija a urgencias ☐	

d. Que el jugador Continúe en el juego e. No hacer nada	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>
8. De las siguientes sustancias, ¿conoce usted alguna en la que se pueda transportar el diente avulsionado de forma segura? (Marque todas las que correspondan)	
a. Agua <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> b. Leche <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> c. Saliva <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> f. Otro <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	d. Suero fisiológico <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> e. Gaseosa <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Especificar cuál: _____
9. ¿Conoce usted el tiempo indicado para la conservación de un diente después de ocurrido un trauma dentoalveolar como la avulsión?	
a. 20 minutos <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> b. 30 minutos <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> c. 1 hora <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> d. No sabe <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	
10. En el momento de presentarse un trauma de tipo intrusivo (introduce el diente dentro de la encía), ¿Cuál sería el manejo inmediato que usted realizaría?	
a. No toco el diente b. Llevo el diente a su posición original con la mano c. Saco el diente d. No sabe cómo manejar el trauma y/o la intrusión de un diente	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>
11. Al momento de presentarse un trauma de tipo fractura coronal (fractura de una parte del diente), ¿qué es lo más indicado para el manejo inmediato?	
a. Buscar el fragmento del diente b. Dirigirse a un Hospital, clínica o puesto de salud c. Acudir a un consultorio odontológico d. No sabe cómo manejar una fractura de la corona del diente	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>
12. Sabe usted ¿Qué es un protector bucal?	
a. Si b. No	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>
13. Un protector bucal es:	
a. Un retenedor removible de acrílico que se usa para mantener la posición de dientes. <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> b. Un dispositivo intraoral de plástico flexible que permite proteger las estructuras orales. <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/>	

c. No sabe.	☐
14. Sabe usted ¿Para qué sirve un protector bucal?	
a. Si	☐
b. No	☐
15. Sabe usted ¿Cuál es el uso del protector bucal?	
a. Ayudará a mejorar la tensión muscular de estrés.	☐
b. Amortiguar golpes en la cavidad bucal	☐
c. No sabe.	☐
16. Sabe usted si los protectores bucales pueden prevenir lesiones	
a. Si	☐
b. No	☐